



SISTEMA INTEGRADO
DE SALUD PÚBLICA

www.sisptandil.gob.ar

INFORMACIÓN VACUNA CoViD-19

USTED RECIBIRÁ UNA DOSIS DE LA VACUNA SPUTNIK-V CONTRA EL SARS-CoV-2 (COVID-19)

La vacuna se basa en una plataforma conocida como "vector viral". Esta tecnología permite generar una respuesta de anticuerpos segura sin producir enfermedad.

El esquema es de dos (2) dosis, con un intervalo mínimo de 21 días entre la primera y la segunda aplicación. Se aplica vía intramuscular en el brazo. Es importante, para lograr la máxima protección, recibir las dos dosis.

Actualmente, esta vacuna está recomendada para personas a partir de los 18 años, independientemente del antecedente de haber padecido CoViD-19.

Si fue contacto estrecho de un caso confirmado, puede vacunarse después de completar el aislamiento correspondiente.

Si está cursando infección aguda por SARS-CoV-2 o tiene síntomas compatibles con esta, la vacunación debe posponerse hasta la resolución del cuadro.

ANTES DE RECIBIR CADA UNA DE LAS DOSIS ES IMPORTANTE QUE INFORME AL PERSONAL SI TIENE ALGUNO DE ESTOS ANTECEDENTES:

- Alergia a cualquier componente de la vacuna o a una vacuna que contenga componentes similares.
- Reacciones alérgicas graves (con compromiso respiratorio que requirió atención médica).
- Enfermedades agudas graves (infecciosas y no infecciosas) o agravamiento de enfermedades crónicas con compromiso del estado general.
- Inmunosupresión, embarazo o lactancia (porque no se ha estudiado su eficacia y seguridad en estos casos).

NO DEBE RECIBIR LA SEGUNDA DOSIS si posterior a la primera presentó complicaciones como reacciones alérgicas generalizadas y graves, convulsiones, entre otras.

EFFECTOS ADVERSOS MÁS FRECUENTES:

- **Locales:** dolor, hinchazón y aumento de temperatura en el lugar de la inyección.
- **Generales:** reacciones a corto plazo como cuadro similar a una gripe de corta duración (caracterizado por escalofríos, fiebre, dolores articulares y musculares, cansancio, malestar general y dolor de cabeza)

Si los síntomas persisten durante más de 72hrs de la aplicación, consultar a un médico y considerar si constituye la definición de caso sospechoso de CoViD-19